

Liste des vaccins antirabiques autorisés en France

Nom du médicament, forme pharmaceutique	Titulaire de l'AMM	Type de procédure/ date d'AMM	Substances actives	Espèces cibles	Posologie et voie d'administration
CANIGEN CHPPi/LR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	VIRBAC	Nationale 05/11/1990	Adénovirus canin, Leptospira interrogans sg canicola, Leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, Parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique	Chiens	Après reconstitution du lyophilisat à l'aide de la suspension, administrer par injection sous-cutanée une dose de vaccin selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination : à partir de 8 semaines d'âge, une injection de CANIGEN CHPPi/L suivie d'une injection de CANIGEN CHPPi/LR 3 à 4 semaines après. L'injection de CANIGEN CHPPi/LR ne doit pas se faire avant 3 mois d'âge. Vaccination de rappel : une injection annuelle de CANIGEN CHPPi/LR.
CANIGEN LR, Suspension injectable	VIRBAC	Nationale 03/01/1983	Leptospira interrogans sg canicola, Leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus rabique	Chiens	Administrer par injection sous-cutanée une dose de vaccin selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination : à partir de 8 semaines d'âge, une injection de CANIGEN L suivie d'une injection de CANIGEN LR 3 à 4 semaines plus tard. L'injection de CANIGEN LR ne doit pas se faire avant l'âge de 3 mois. Vaccination de rappel : une injection annuelle de CANIGEN LR.
EURICAN DAP-LR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE	Nationale 16/07/1987	Adénovirus canin, Leptospira interrogans sg canicola, Leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, Parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus rabique	Chiens	Reconstituer de manière aseptique le contenu du lyophilisat avec la suspension injectable. Bien agiter avant emploi. Tout le contenu du flacon reconstitué doit être administré en une seule dose. Une dose de 1 mL par voie sous-cutanée, selon les modalités suivantes : Primovaccination : Une injection avec Eurican DAP-LR à partir de l'âge de 12 semaines, 4 semaines avant ou après l'injection du vaccin Eurican DAP-L. Dans les cas où des taux élevés d'anticorps d'origine maternelle sont suspectés par le vétérinaire et lorsque la primovaccination a été achevée avant l'âge de 16 semaines, une troisième injection utilisant le vaccin BOEHRINGER INGELHEIM contenant le virus de la maladie de Carré, l'adénovirus et le parvovirus est recommandée à partir de l'âge de 16 semaines, et au moins 3 semaines après la seconde injection. Rappel : administrer une dose 12 mois après la fin de la primovaccination.

En date du 7 juin 2021

					Les chiens doivent être revaccinés avec une seule dose de rappel chaque année. En cas de risque épidémiologique important de leptospirose, un rappel semestriel est recommandé.
EURICAN DAPPI-LR, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE	Reconnaissance mutuelle, FR=EMR 13/05/2005	Adénovirus canin, Leptospira interrogans sg canicola, Leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, Parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique	Chiens	Injecter une dose de 1 mL par voie sous-cutanée selon les modalités suivantes : Primovaccination : Une injection avec EURICAN DAPPI-LR à partir de l'âge de 12 semaines, 3 à 5 semaines avant ou après l'injection du vaccin EURICAN DAPPI-L. Dans les cas où des taux élevés d'anticorps d'origine maternelle sont suspectés par le vétérinaire et lorsque la primovaccination a été achevée avant l'âge de 16 semaines, une troisième injection avec un vaccin BOEHRINGER INGELHEIM contre la maladie de Carré, les adénoviroses et la parvovirose est recommandée à partir de l'âge de 16 semaines, et au moins 3 semaines après la seconde injection. Rappels : Administrer une dose 12 mois après la fin de la primovaccination. Les chiens doivent être vaccinés à nouveau avec une seule dose de rappel tous les ans.
EURICAN LR, Suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE	Nationale 16/07/1987	Leptospira interrogans sg canicola, Leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus rabique	Chiens	Utiliser pour l'injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique et/ou désinfectant. Respecter les conditions habituelles d'asepsie. Une dose de 1 mL par voie sous-cutanée selon les modalités suivantes : Primovaccination : Une injection : à partir du 3ème mois d'âge. Une injection : 1 mois avant ou après avec un vaccin BOEHRINGER INGELHEIM contre les leptospiroses. Rappels : Annuels. En cas de risque épidémiologique important de leptospirose, un rappel semestriel est recommandé.
FELIGEN CRP/R, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable	VIRBAC	Nationale 15/02/1988	Calicivirus félin, Herpesvirus félin, Parvovirus félin, virus rabique	Chats	Reconstituer le vaccin en mélangeant le lyophilisat et la suspension. Agiter doucement et administrer immédiatement. Administrer une dose de vaccin par voie sous-cutanée selon le schéma vaccinal ci-dessous : Primo-vaccination : Une première injection de FELIGEN CRP à partir de l'âge de 8/9 semaines Une deuxième injection de FELIGEN CRP/R 3 à 4 semaines plus tard. Les anticorps d'origine maternelle peuvent diminuer la réponse immunitaire à la vaccination. Si la présence de tels anticorps d'origine

En date du 7 juin 2021

					maternelle est suspectée, une troisième injection vaccinale à partir de l'âge de 15 semaines peut être appropriée. Rappels : 1 ^{er} rappel un an après la primovaccination : 1 dose de FELIGEN CRP/R Puis rappels annuels pour les valences CRP (FELIGEN CRP) et rappel à intervalles de 3 ans maximum pour la valence rage (FELIGEN CRP/R).
NOBIVAC RAGE, Suspension injectable	INTERVET	Nationale 03/04/1985	virus rabique	Bovins, Chats, Chiens, Equins	1 dose de 1 mL, par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Chiens et chats - Primo-vaccination à partir de 12 semaines d'âge, une injection de 1 mL. - Rappel annuel : une injection de 1 mL. Bovins et équins Primo-vaccination à partir du 6 ^{ème} mois, une injection de 1 mL. Rappel annuel : une injection de 1 mL.
PUREVAX RABIES, Suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH	Centralisée 18/02/2011	virus rabique	Chats	Voie sous-cutanée. Respecter les conditions habituelles d'asepsie. Administrar une dose de 1 ml, selon le schéma de vaccination suivant: Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 12 semaines. Rappel : 1 an après la primovaccination, puis à 3 ans maximum d'intervalle. Voyages dans des pays exigeant un test sérologique de la rage : l'expérience a montré que certains animaux vaccinés, bien que protégés, ne présentent pas le taux d'anticorps de 0.5 UI/mL requis par certains pays. Les vétérinaires praticiens peuvent alors envisager deux vaccinations. Le meilleur moment pour effectuer la prise de sang est environ 28 jours après la vaccination.
RABIGEN MONO, Suspension injectable	VIRBAC	Nationale 26/01/1987	virus rabique	Chats, Chiens, Equins	Administrar par injection sous-cutanée (chiens et chats) ou intramusculaire (équins) une dose de vaccin de 1 ml selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination Chiens et chats : 1 dose à partir de 3 mois d'âge. Equins : 1 dose à partir de 6 mois d'âge. Vaccination de rappel Chiens, équins : une injection annuelle. Chats : après un 1 ^{er} rappel un an après la primovaccination, rappels suivants à intervalles de 3 ans maximum.

RABIGEN MULTI, Suspension injectable	VIRBAC	Nationale 20/05/2010	virus rabique	Chats, Chiens, Equins	Administrer par injection sous-cutanée (chiens et chats) ou intramusculaire (équins) une dose de vaccin de 1 ml selon le schéma vaccinal suivant : Primo-vaccination Chiens et chats : 1 dose à partir de 3 mois d'âge Equins : 1 dose à partir de 6 mois d'âge. Vaccination de rappel Chiens, chats, équins : une injection annuelle
RABISIN, Suspension injectable	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE	Nationale 07/01/1981	virus rabique	Bovins, Chats, Chiens, Equins, Furets, Ovins	Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée (excepté chez les équins) ou par voie intramusculaire selon le calendrier suivant : <u>Chiens, chats</u> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 12 semaines* Rappels : 1 an après la primo-vaccination. Puis, à intervalle de 3 ans maximum** <u>Furets</u> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 3 mois Rappels : Annuels <u>Chevaux</u> <i>De — de 6 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection 1 mois plus tard Rappels : Annuels <i>De + de 6 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection Rappels : Annuels <u>Bovins, ovins</u> <i>De - de 9 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection entre 9 et 12 mois d'âge Rappels : Annuels <i>De + de 9 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection Rappels : Annuels *Dans le cas d'un chien ou d'un chat vacciné avant l'âge de 12 semaines, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection à 12 semaines d'âge ou plus tard. ** Dans tous les cas, l'intervalle entre les rappels doit respecter la réglementation en vigueur dans le pays. *** Dans le cas où un cheval, un bovin ou un ovin est vacciné avant l'âge de 4 mois, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection faite à 4 mois d'âge ou plus tard.

En date du 7 juin 2021

<p>RABISIN MULTI, Suspension injectable</p>	<p>BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE</p>	<p>Nationale 06/04/2010</p>	<p>virus rabique</p>	<p>Bovins, Chats, Chiens, Equins, Furets, Ovins</p>	<p>Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée (excepté chez les équins) ou par voie intramusculaire selon le calendrier suivant :</p> <p><u>Chiens, chats</u> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 12 semaines* Rappels : 1 an après la primo-vaccination. Puis, à intervalle de 3 ans maximum**</p> <p><u>Furets</u> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 3 mois Rappels : Annuels</p> <p><u>Chevaux</u> <i>De - de 6 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection 1 mois plus tard Rappels : Annuels <i>De + de 6 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection Rappels : Annuels</p> <p><u>Bovins, ovins</u> <i>De - de 9 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection entre 9 et 12 mois d'âge Rappels : Annuels <i>De + de 9 mois</i> Primo-vaccination : 1 injection* Rappels : Annuels</p> <p>*Dans le cas d'un chien ou d'un chat vacciné avant l'âge de 12 semaines, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection à 12 semaines d'âge ou plus tard. ** Dans tous les cas, l'intervalle entre les rappels doit respecter la réglementation en vigueur dans le pays. *** Dans le cas où un cheval, un bovin ou un ovin est vacciné avant l'âge de 4 mois, le schéma de primo-vaccination devrait être complété par une injection faite à 4 mois d'âge ou plus tard.</p>
---	--	---------------------------------	----------------------	---	--

<p>VERSICAN PLUS DHPPi/L4R LYOPHILISAT ET SUSPENSION POUR SUSPENSION INJECTABLE POUR CHIENS, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable</p>	<p>ZOETIS BELGIUM</p>	<p>Centralisée 07/05/2014</p>	<p>Adénovirus canin, Leptospira interrogans sg australis, Leptospira interrogans sg canicola, Leptospira interrogans sg grippotyphosa, Leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, Parvovirus canin, virus de la maladie de carré, virus parainfluenza canin, virus rabique</p>	<p>Chiens</p>	<p>Voie sous-cutanée. <u>Dose et voie d'administration</u> : Reconstituer de façon aseptique le lyophilisat avec la suspension. Bien agiter et administrer immédiatement tout le contenu (1 ml) du produit reconstitué. Le vaccin reconstitué : couleur rose / rouge, ou jaune avec une légère opalescence. <u>Schéma de primo-vaccination</u> : Deux doses de Versican Plus DHPPi/L4R à 3-4 semaines d'intervalle à partir de 8-9 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d'âge. <u>Rage</u> : L'efficacité de la fraction de la rage est prouvée, après une seule dose à 12 semaines d'âge dans les études de laboratoire. Par conséquent, la première dose peut être administrée avec Versican Plus DHPPi/L4. Dans ce cas, la deuxième vaccination avec Versican Plus DHPPi/L4R ne doit pas être administrée avant 12 semaines. Cependant, dans les études terrain, 10 % des chiens séronégatifs n'ont pas montré de séroconversion (> 0,1 UI / ml) 3-4 semaines après une seule primo-vaccination contre la rage. Certains animaux peuvent aussi ne pas montrer de titres > 0,5 UI/ml, après la primo-vaccination. Les titres anticorps baissent au cours des 3 ans de la durée d'immunité, même si les chiens sont protégés en cas d'épreuve virulente. En cas de voyage dans des zones à risque, ou bien en dehors de l'Union Européenne, des vétérinaires pourraient souhaiter effectuer une vaccination supplémentaire contre la rage au-delà de 12 semaines d'âge, pour garantir chez les chiens vaccinés un taux d'anticorps > 0,5 UI/ml, généralement considéré comme suffisamment protecteur et qui satisfait aux exigences pour voyager (titres anticorps > 0,5 UI/ml). En cas de besoin, les chiens de moins de 8 semaines peuvent être vaccinés car l'innocuité du produit a été démontrée chez les chiens âgés de 6 semaines. <u>Rappel de vaccination</u> : Une dose unique de Versican Plus DHPPi/L4R devrait être administrée tous les 3 ans. Un rappel de vaccination annuel étant requis pour le virus Parainfluenza canin et les leptospires, une dose unique de vaccin Versican Plus Pi/L4 peut donc être utilisée tous les ans.</p>
---	-----------------------	-----------------------------------	--	---------------	--

En date du 7 juin 2021

<p>VERSICAN PLUS Pi/L4R LYOPHILISAT ET SUSPENSION POUR SUSPENSION INJECTABLE POUR CHIENS, Lyophilisat et suspension pour suspension injectable</p>	<p>ZOETIS BELGIUM</p>	<p>Centralisée 31/07/2014</p>	<p>Leptospira interrogans sg bratislava, Leptospira interrogans sg canicola, Leptospira interrogans sg grippotyphosa, Leptospira interrogans sg icterohaemorrhagiae, virus parainfluenza canin, virus rabique</p>	<p>Chiens</p>	<p>Voie sous-cutanée. <u>Dose et voie d'administration :</u> Reconstituer de façon aseptique le lyophilisat avec la suspension. Bien agiter et administrer immédiatement tout le contenu (1 ml) du produit reconstitué. Vaccin reconstitué : couleur rose/rouge ou jaunâtre, avec une légère opalescence. <u>Schéma de primo-vaccination :</u> Deux doses de Versican Plus Pi/L4R à 3-4 semaines d'intervalle à partir de 8-9 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d'âge. <u>Rage :</u> L'efficacité de la fraction rage est prouvée, après une seule dose à 12 semaines d'âge dans les études de laboratoire. La première dose peut donc être administrée avec Versican Plus Pi/L4. Dans ce cas, la seconde vaccination avec Versican Plus Pi/L4R ne doit pas être administrée avant 12 semaines. Cependant, dans les études terrain 10 % des chiens séronégatifs n'ont pas montré de séroconversion (> 0,1 UI / ml) 3-4 semaines après une seule primo-vaccination contre la rage Certains animaux peuvent aussi ne pas montrer de titres > 0,5 UI/ml, après la primo-vaccination. Les titres en anticorps baissent au cours des 3 ans de la durée d'immunité, même si les chiens sont protégés en cas d'épreuve virulente. En cas de voyage dans des zones à risque, ou bien en dehors de l'Union Européenne, les vétérinaires qui le souhaitent peuvent effectuer des vaccinations supplémentaires contre la rage au-delà de 12 semaines d'âge, pour garantir chez les chiens vaccinés un taux d'anticorps > 0,5 UI/ml, généralement considéré comme suffisamment protecteur et qui satisfait aux exigences pour voyager (titres anticorps > 0,5 UI/ml). En cas de besoin, les chiens de moins de 8 semaines peuvent être vaccinés car l'innocuité de ce produit a été démontrée chez les chiens de 6 semaines. <u>Rappel :</u> Une dose unique de Versican Plus Pi/L4R devrait être administrée tous les 3 ans. Un rappel de vaccination annuel étant requis pour le virus Parainfluenza canin et les leptospires, une dose unique du vaccin Versican Plus Pi/L4 peut donc être administrée tous les ans.</p>
--	-----------------------	-----------------------------------	---	---------------	--

En date du 7 juin 2021

<p>VERSIGUARD RABIES, Solution injectable</p>	<p>ZOETIS FRANCE</p>	<p>Reconnaissance mutuelle, FR=EMC 09/05/2006</p>	<p>virus rabique</p>	<p>Bovins, Caprins, Chats, Chiens, Equins, Furets, Ovins, Porcs charcutier, Porcs reproducteur</p>	<p>Chiens : voie sous-cutanée. Toutes les autres espèces : voie sous-cutanée ou intramusculaire.</p> <p>Agiter le flacon avant l'utilisation.</p> <p>L'administration d'une dose unique de 1 mL est suffisante quel que soit l'âge, le poids, ou la race de l'animal.</p> <p><u>Primo-vaccination</u> :</p> <p>Les animaux de toutes les espèces cibles peuvent être vaccinés à partir de 12 semaines d'âge. La primo-vaccination est faite avec une dose unique de 1 mL de vaccin.</p> <p><u>Rappel</u> :</p> <p>Chiens : une dose unique de VERSIGUARD RABIES doit être administrée tous les 3 ans. Les titres anticorps baissent au cours des 3 ans de la durée d'immunité, même si les chiens sont protégés en cas d'épreuve virulente. En cas de voyage dans des zones à risque, ou bien à l'extérieur de l'Union Européenne, les vétérinaires qui le souhaitent peuvent effectuer des vaccinations supplémentaires contre la rage, pour garantir chez les chiens vaccinés un titre en anticorps $\geq 0,5\text{UI/mL}$, généralement considéré comme suffisamment protecteur et qui satisfait aux exigences pour voyager (titres anticorps $\geq 0,5\text{UI/mL}$).</p> <p>Chats, bovins, porcins, ovins, caprins, chevaux et furets : les animaux doivent être revaccinés avec une dose de 1 mL de vaccin 1 an après la première vaccination.</p> <p>Après le premier rappel (administré 1 an après la primo-vaccination), les animaux doivent être revaccinés tous les 2 ans avec une dose de 1 mL de vaccin.</p> <p><u>Utilisation comme solvant de la gamme VERSICAN PLUS</u> :</p> <p>Le contenu d'un flacon de VERSICAN PLUS doit être reconstitué avec le contenu d'un flacon de VERSIGUARD RABIES (à la place du solvant). Une fois mélangé, le contenu du flacon doit être rose / rouge ou jaunâtre avec une légère opalescence. Les vaccins ainsi mélangés doivent être administrés immédiatement par voie sous-cutanée.</p> <p><u>Administration concomitante avec des vaccins canins de la gamme VANGUARD</u> :</p> <p>Les vaccins VANGUARD doivent être reconstitués conformément aux</p>
---	----------------------	---	----------------------	--	--

En date du 7 juin 2021

					données des Résumés des Caractéristiques des produits. Le flacon reconstitué doit être bien agité puis mélangé avec 1 mL de VERSIGUARD RABIES, soit dans le flacon de VERSIGUARD RABIES, soit dans la seringue. Bien agiter VERSIGUARD RABIES avant emploi. Les vaccins mélangés doivent être agités doucement puis administrés immédiatement par voie sous-cutanée.
--	--	--	--	--	--